



ΑΛΚΑΝΙΑ - ΚΥΚΛΟΑΛΚΑΝΙΑ

Υδρογονάνθρακες : αποτελούνται μόνο από υδρογόνο και άνθρακα

Κορεσμένοι Υδρογονάνθρακες




Αιθάνιο
 C_2H_6



Αιθυλένιο
 C_2H_4


Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες




Βενζόλιο
 C_6H_6

Ακόρεστοι Υδρογονάνθρακες


Οι κορεσμένοι Υδρογονάνθρακες ΔΕΝ περιέχουν π δεσμούς



Προπάνιο



Βουτάνιο







Πεντάνιο

Η κατάληξη **–άνιο** χρησιμοποιείται για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες

Ονοματολογία των Αλκανίων

Ορισμένα κοινά (εμπειρικά) ονόματα έχουν χρησιμοποιηθεί για εκατοντάδες έτη και χρησιμοποιούνται ακόμη συχνά.



Μυρμηκό οξύ

Απομονώθηκε από μυρμήγκια (στα αγγλικά ονομάζεται formic acid, φορμικό οξύ, από τη λατινική ονομασία των μυρμηγκιών, *formica*)

Ουρία

Απομονώθηκε από ούρα

Μορφίνη

Παυσίπονο που πήρε το όνομά του από τον θεό των ονείρων, τον Μορφέα

Βαρβιτουρικό οξύ

Ο Adolf von Baeyer ονόμασε αυτή την ένωση προς τιμή μιας γυναίκας που ονομαζόταν Barbara

1892, Κανόνες της Γενεύης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ IUPAC

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ





ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ - ΤΑΞΗ ΕΝΩΣΕΩΝ

(ΕΙΔΟΣ, ΠΛΗΘΟΣ,
ΘΕΣΕΙΣ)



(ΑΚΥΚΛΗ
ΚΥΚΛΙΚΗ
ΔΙΚΥΚΛΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ)

(ΕΙΔΟΣ, ΠΛΗΘΟΣ, ΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ)


(ΕΙΔΟΣ, ΠΛΗΘΟΣ,
ΘΕΣΕΙΣ)



2-ΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ ή
ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ



2-ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ ή
ΙΣΟΠΕΝΤΑΝΙΟ



2,2-ΔΙΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ
ή ΝΕΟΠΕΝΤΑΝΙΟ

ΠΡΟΘΕΜΑ ΑΚΥΚΛΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ

C	C-C	C-C-C	C-C-C-C	C-C-C-C-C	C-C-C-C-C-C	
μεθ-	αιθ-	προπ-	βουτ-	πεντ-	εξ-	επτ-

ΔΙΑΚΛΑΔΙΣΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ :

- Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
- ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
- ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
- ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΥΠΟΚΑΣΤΑΣΤΑΤΕΣ

ΟΜΟΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ :




μεθυλο-



αιθυλο-




η-προπυλο-



ισοπροπυλο-



η-βουτυλο-



ισοβουτυλο-




sec-βουτυλο-




t- βουτυλο-

Μητρικός σκελετός με τη μακρύτερη συνεχόμενη αλυσίδα ατόμων άνθρακα.



Επιλέξτε τη μακρύτερη
συνεχόμενη αλυσίδα



Ο μητρικός σκελετός
έχει 9 άτομα άνθρακα

Ο μητρικός σκελετός που έχει 9 άτομα άνθρακα, φέρει το όνομα **εννεάνιο**.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΛΚΑΝΙΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΠΡΟΘΕΜΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΚΑΝΙΟΥ
1	Μεθ	Μεθάνιο
2	Αιθ	Αιθάνιο
3	Προπ	Προπάνιο
4	Βουτ	Βουτάνιο
5	Πεντ	Πεντάνιο
6	Εξ	Εξάνιο
7	Επτ	Επτάνιο
8	Οκτ	Οκτάνιο
9	Εννε	Εννεάνιο
10	Δεκ	Δεκάνιο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΠΡΟΘΕΜΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΚΑΝΙΟΥ
11	Ενδεκ	Ενδεκάνιο
12	Δωδεκ	Δωδεκάνιο
13	Δεκατρι	Δεκατριάνιο
14	Δεκατετρ	Δεκατετράνιο
15	Δεκαπεντ	Δεκαπεντάνιο

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός πιθανοί μητρικοί σκελετοί, επιλέγεται εκείνος με τους περισσότερους Υποκαταστάτες.

Σωστό


(3 υποκαταστάτες)



Ο μητρικός σκελετός
έχει 7 άτομα άνθρακα




Λάθος

(2 υποκαταστάτες)



Ο μητρικός σκελετός
έχει 7 άτομα άνθρακα

Εάν ο μητρικός σκελετός είναι κυκλικός (δακτύλιος ατόμων άνθρακα), προστίθεται το πρόθεμα, “κύκλο” στην αρχή του ονόματος του μητρικού σκελετού.




Κυκλοπροπάνιο

Κυκλοβουτάνιο

Κυκλοπεντάνιο


Προσδιορισμός των υποκαταστατών

Αιθυλο-



Ένας δακτύλιος μπορεί να είναι είτε μητρικός σκελετός
(έχει τα περισσότερα άτομα C) είτε υποκαταστάτης ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων άνθρακα.


Υποκαταστάτης



Μητρικός
σκελετός

Προπυλοκυκλοεξάνιο


Υποκαταστάτης



Μητρικός
σκελετός

1-Κυκλοπροπλοβουτάνιο

Για υποκαταστάτες με περίπλοκες διακλαδώσεις



- Αριθμείται η μακρύτερη αλυσίδα ανθράκων **ΕΝΤΟΣ** του υποκαταστάτη. Αρχή από το άτομο άνθρακα που συνδέεται άμεσα με το μητρικό σκελετό
- Ονομάζεται ο υποκαταστάτης (**σε αυτή την περίπτωση βούτυλο**)
- Ονομάζεται και Αριθμείται η πλευρική ομάδα του υποκαταστάτη (**σε αυτή την περίπτωση 2-μέθυλο**)
- Το όνομα του υποκαταστάτη είναι (**2-μεθυλοβούτυλο**)

Μερικοί διακλαδισμένοι υποκαταστάτες έχουν εμπειρικά ονόματα τα οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα από τα ονόματά τους κατά IUPAC.

Διακλαδισμένη αλκυλομάδα με 3 άτομα άνθρακα




Πρόπυλο



Ισοπρόπυλο
(1-μεθυλοαιθυλο)

Διακλαδισμένες αλκυλομάδες με 4 άτομα άνθρακα



Βούτυλο



sec-Βούτυλο
(1-μεθυλοπρόπυλο)




Ισοβούτυλο
(2-μεθυλοπρόπυλο)




tert-Βούτυλο
(1,1-διμεθυλοαιθυλο)

Διακλαδισμένες αλκυλομάδες με 5 άτομα άνθρακα




Σύνθεση της Συστηματικής Ονομασίας ενός Αλκανίου

Ο αριθμός ή αριθμός θέσης χρησιμοποιείται για να γνωστοποιηθεί που είναι συνδεδεμένος κάθε υποκαταστάτης με το μητρικό σκελετό.



2-Μεθυλοπεντάνιο




3-Μεθυλοπεντάνιο


Τα παραπάνω μόρια είναι ισομερή, και έχουν το ίδιο όνομα μητρικού σκελετού. Το πλήρες όνομά τους διαφέρει, επειδή δεν είναι πανομοιότυπα.

Εάν υπάρχει ΕΝΑΣ υποκαταστάτης, αριθμείται ο μητρικός σκελετός έτσι ώστε η θέση του υποκαταστάτη να έχει το μικρότερο αριθμό.

Σωστό




Λάθος




Όταν υπάρχουν πολλοί υποκαταστάτες, αριθμείται ο μητρικός σκελετός έτσι ώστε ο πρώτος υποκαταστάτης να έχει το μικρότερο δυνατό αριθμό θέσης.

Σωστό




Λάθος




Το **2, 5 , 5** υπερισχύει του **3, 3 , 6**

Εάν οι πρώτοι υποκαταστάτες έχουν ίδιο αριθμό θέσης, τότε αριθμείται ο μητρικός σκελετός έτσι ώστε ο αριθμός θέσης του δεύτερου υποκαταστάτη να είναι ο μικρότερος δυνατός.

Σωστό




Λάθος




Το 2,3,6 υπερισχύει του 2,5,6

Εάν διατηρείται “ισοπαλία”, τότε δίνεται ο μικρότερος αριθμός ακολουθώντας την αλφαβητική σειρά των υποκαταστάτων

Σωστό




Λάθος




Το 1-βρώμο υπερισχύει του 1-χλωρο

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τα κυκλοαλκάνια

Σωστό



Λάθος




Το 1,3,3 υπερισχύει του 1,3,3

- Για τη συγκρότηση του πλήρους ονόματος, ορίζεται ο αριθμός θέσης κάθε υποκαταστάτη και ταξινομούνται οι υποκαταστάτες πριν το όνομα του μητρικού σκελετού κατ' αλφαριθμητική σειρά.
- Χρησιμοποιείται πρόθεμα (δι, τρι, τετρα, πεντα, κ.ο.κ.) εάν ένας υποκαταστάτης εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές σε μία ένωση.
- Τα προθέματα ΔΕΝ χρησιμοποιούνται κατ' αλφαριθμητική σειρά, με εξαίρεση το πρόθεμα “ισο”.


ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ ΑΚΥΚΛΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ :


- Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
- Ο ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ : X, R, NO₂, =N₂, -N₃, -NO
- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΕΣΜΩΝ
- ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΠΛΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΣΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΚΥΛΟΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ




2-Πεντένιο ή
Πεντ-2-ένιο (IUPAC)




3-Μεθυλο-2-πεντένιο




3-Μεθυλο-1,4-πενταδιένιο




2,4-Επταδιένιο




2-Βουτύνιο




1-Εξεν-5-ύνιο ή Εξ-1-εν-5-ύνιο
(IUPAC)



Εξ-4-υν-1-ύνιο




6-Βρωμο-4-μεθυλοκτ-3-ένιο




3-Βρωμο-5-μεθυλοκτ-4-ένιο


Ακόρεστοι υποκαταστάτες (αρίθμηση από τη σύνδεση):




Βινυλο-




1-Προπενυλο-




Αλλυλο-




2-Προπυνυλο-



Αιθυλιδενο-




Προπυλιδενο-




Προπυλιδυνο-

Υποκαταστάτες με δύο συνδέσεις:



Μεθυλενο-




Αιθυλενο-




Τριμεθυλενο-




Πενταμεθυλενο-




4-Αιθυλιδενεπτ-2-έν-5-ύνιο




3-Αιθυλ-1,6-διμεθυλκυκλοεξα-1,3-διένιο



(E)-7-Χλωροοκτ-2-ένιο



1-Βρωμο-2-μεθυλκυκλοβουτ-1-ένιο




2-Βρωμοκυκλοβουτ-1-εν-1-καρβοξυλικό οξύ

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

$\text{-COOH} > \text{-COOR} > \text{-COX} > \text{-CONH}_2 > \text{-C}\equiv\text{N} > \begin{matrix} \text{-C=O} \\ | \\ \text{H} \end{matrix} > \begin{matrix} \text{-C=O} \\ | \\ \text{R} \end{matrix} >$
 $> \text{-OH} > \text{-SH} > \text{-NH}_2 > \text{=NH} > \text{=, } \equiv, \text{ =\& } \equiv > \text{-X} > \text{-OR} >$
 $> \text{-R} > \text{-SR} > \text{-NO}_2 > \text{-NO} > \text{-N}_3 > \text{=N}_2$


Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ




3-Αμινοβουτανοικό οξύ




Πεντ-3-ενοικό οξύ




2-Βρωμο-3-οξοβουτανάλη




3-Μεθυλο-5-υδροξυπενταν-2-όλη




4-Αμινοπενταν-2-όλη




2-Μεθοξυ-6-μεθυλοεπτάνιο



2-Βρωμο-7-μεθυλοκτάνιο




5-Νιτρο-2-χλωροεξάνιο




2-Μεθυλο-7-χλωροεννεάνιο


ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ




Βενζόλιο




1-Χλωροβενζόλιο




Τολουόλιο




1-Βρωμο-2-μεθυλοβενζόλιο




Φαινόλη




Ανιλίνη




Ανισόλη ή
Μεθυλοφαινυλαιθέρας




Βενζοικό οξύ




Βενζοικός Μεθυλεστέρας




Βενζουλοχλωρίδιο




Βενζαμίδιο




Βενζονιτρίλιο




Ακετοφαινόνη



Προπιοφαινόνη



Βουτυροφαινόνη ή
1-Φαινυλο-1-βουτανόνη



Βενζαλδεύδη

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

-O- : οξα-

-S- : θεια-

-N< : αζα

-ιρ-

(τρι)

-ετ-

(τετρα)

-ολ-

(πεντα)

-ιν-

(εξα)

-επ-

(επτα)

-οκ-


(οκτα)

-εν-


(εννεα)

-εκ-

(δεκα)




Οξιράνιο




Οξιρένιο




Θειετάνιο




Οξετάνιο




Οξολάνιο ή
Τετραυδροφουράνιο




1H-Πυρρόλιο




Πυρρολιδίνη




2,3-Διυδρο-1H-πυρρόλιο




Φουράνιο



Θειοφαίνιο




Πυριδίνη



Κινολίνη

Για μόρια που είναι μεγάλα και πολύπλοκα, υπάρχουν ΠΟΛΛΟΙ περισσότεροι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται χρησιμοποιώντας το σύστημα IUPAC.



Εσομεπραζόλη ή Nexium (φάρμακο κατά της
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης